TOUT DOIT ÊTRE NEUF CHAQUE FOIS QUE VOUS CONSOMMEZ

Prévenez l'hépatite C si vous vous injectez, fumez ou inhalez des drogues

CATIE
La source canadienne de renseignements sur le VIH et l'hépatite C

TOUT DOIT ÊTRE NEUF CHAQUE FOIS QUE VOUS CONSOMMEZ

Prévenez l'hépatite C si vous vous injectez, fumez ou inhalez des drogues.



- L'hépatite C peut se transmettre si vous partagez du matériel qui est entré en contact avec du sang infecté.
- Utilisez du matériel neuf si vous vous injectez des drogues, y compris les aiguilles, les seringues, les filtres, l'eau et les cuillères et autres réchauds.
- Utilisez votre propre matériel si vous fumez des drogues, y compris les pipes, les tiges et les pièces buccales.
- Utilisez votre propre paille ou papier enroulé si vous sniffez des drogues.

> **Certains médicaments anti-hépatite C peuvent altérer les effets des drogues que vous prenez, ce qui peut contribuer à une surdose. Si vous prenez des drogues après avoir commencé un traitement contre l'hépatite C, allez-y doucement, consommez avec une personne en qui vous avez confiance et ayez de la naloxone à portée de main.**

> **Un site de consommation supervisée, un site de prévention des surdoses ou un programme d'aiguilles et de seringues peut vous renseigner sur les moyens de consommer des drogues de façon plus sécuritaire et de prévenir les surdoses.**

La production de cette publication a été rendue possible grâce à des contributions financières du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario et de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Les opinions exprimées dans ce document ne reflètent pas nécessairement celles de nos bailleurs de fonds.

© 2019, CATIE (Réseau canadien d'info-traitements sida). Tous droits réservés.
No. du Centre de distribution de CATIE : ATI-70211_10.